



153. 力学の式をたてるのを忘れがち、常に意識しておく。

(1) 固定しているの2力学の式は変えずに。



⇒




~ は不明数

熱力学第一法則  $Q_{in} = \Delta U + W_{out}$  より


$$Q = \Delta U + 0 \quad \therefore \Delta U = Q$$

(※ 一方で、この条件より定積モル比熱  $C_v$  をだせる。  
 $Q = nC_v\Delta T$  (← モル比熱の定義。1molの1°C分がCより)  
 $\therefore C_v = \frac{Q}{n(T_1 - T_0)} \dots \textcircled{1}$  (2)で使う)

(2)



⇒



力のつり合いより

前)  $P_1 S = P_0 S + mg$   
 $\therefore P_1 = P_0 + \frac{mg}{S}$

後)  $P' S = P_0 S + mg$   
 $\therefore P' = P_0 + \frac{mg}{S}$

⇒ 等圧変化なのだ

(a) 単原子分子と書いてないので  $\Delta U = \frac{3}{2} nR\Delta T$  が使えない。  
 このときは定積モル比熱  $C_v$  を使った式

$$\Delta U = nC_v\Delta T$$

で考える。

定積モル比熱  $C_v$  は  $Q$  ではなく、 $\Delta U$  をだすために使うのが計算のテクニック。定積変化でなくても  $\Delta U = nC_v\Delta T$  は成立。

153 (2) (a) 続き

① 式  $C_V = \frac{Q}{n(T_1 - T_0)}$  を用いて  $\Delta U$  を考えると

$$\Delta U = n C_V (T_2 - T_0) \quad (\because \Delta U = n C_V \Delta T)$$

$$= n \cdot \frac{Q}{n(T_1 - T_0)} \cdot (T_2 - T_0)$$

$$\therefore \Delta U = \frac{T_2 - T_0}{T_1 - T_0} Q$$

※ 付属の解説のように、はっと出す形はめずらしい。  
 $C_V$  を使って  $\Delta U$  を求める ことに慣れておこう。

(b) 図の右に書いたつりあいの式より、今回の変化は定圧変化であり、  
そのときの圧力  $P_1$  は

$$P_1 = P_0 + \frac{mg}{S}$$

と存在。定圧変化のときは特別に  $W_{out} = P \Delta V$  が成立するので

$$W_{out} = P_1 \cdot S l$$

$$= (P_0 + \frac{mg}{S}) \cdot S l$$

$$= \underline{P_0 S l + m g l}$$

(c) 熱力学第1法則の式  $Q_{in} = \Delta U + W_{out}$  に (a) (b) の答えを代入して、

$$Q_{in} = \frac{T_2 - T_0}{T_1 - T_0} Q + P_0 S l + m g l$$